

MANUAL DE EMPLEO



Regulador Botánico de fitopatógenos de suelo

Instrucciones de uso

En función a la densidad de inóculo patogénico presente en el suelo, utilice de 12 a 15 litros de B2H por hectárea,

Mezcle en 2,500 a 3,500 litros de agua, la mitad de la cantidad de B2H a utilizar y riegue el suelo. Al día siguiente utilice la misma cantidad de agua para aplicar el resto del producto. Después de la segunda aplicación, asegúrese que la lámina de agua haya permeado al menos de 20 a 25 cm dentro del perfil del suelo para obtener una adecuada reducción del inóculo patogénico.

Se debe esperar entre 7 a 10 días para que el producto ejerza adecuadamente su función. Posteriormente a esta fase, se recomienda llevar a cabo la inoculación con microorganismos benéficos y después la siembra de las plántulas.

El producto funciona mejor cuando se emplea conjuntamente con plásticos agrícolas (principalmente transparentes) y melaza, los cuales promueven un aumento de la temperatura del suelo, y con esto un mejor control de los microorganismos patogénicos.

B2H es un producto compatible con fertilizantes y otros pesticidas de uso común.



Oriente 7 # 158, Ciudad Industrial

Celaya, Gto. CP 38010

Teléfonos: (461) 6087503; 6088752

Celulares: (461) 2067629; 2275889

Correos: info@bioqualitum.com; bioqualitum@gmail.com

www.bioqualitum.com